


心筋 MIBG シンチグラフィ検査について

どんな検査？



正常例

疾患例

心筋シンチ MIBG とは、特殊な薬剤を注射して心臓周囲の神経にお薬がどの程度集まるかを画像にし、心不全や心筋症における交感神経機能の程度を診断できます。パーキンソン病およびレビー小体型認知症の診断に有用です。

検査時の流れ

準備

お薬の注射がありますので、楽な服装でお越しください。投与される放射性医薬品は必要最低限の量なので、体への影響も極わずかです（レントゲン検査・CT 検査と同等の被ばく量です）。



検査

お薬を注射してから 15 分後と 3 時間後に **2 回撮影**します。専用の装置でベッドに仰向けに寝て撮影します。検査当日の食事の制限はありません。



検査の注意点

- 次のお薬を服用されている方は、事前に主治医にご相談ください。
【**三環系・四環系抗うつ薬、交感神経緩和薬、交感神経刺激薬**】などは前 1~2 日間服用を控えていただく場合があります。
- 妊娠されている方、妊娠の可能性のある方、また授乳中の方は、検査前に担当者にお申し出ください。
- 使用する放射線医薬品は特殊な薬剤です。予約日時を過ぎてしまうと**当日の検査が出来なくなる**こともあるため、予約日時は必ずお守りいただくようお願いいたします。やむを得ず来院できない際は、前日までに当院にご連絡ください。

